

Paracetamol poisoning

تسمم الباراسيتامول

Source

Abimol – Paracetamol – Cetal – Paramol

Toxic dose الجرعة السامة

- في الكبار : ٧.٥ جرام (١٥ قرص من الباراسيتامول ٥٠٠ مجم)

- في الأطفال : ١٥٠ مجم / كجم

Diagnosis

- أول ٢٤ ساعة : ممكن يكون مغيثش أي أعراض .. لكن أحياناً بييجي بغثيان و قيء و

مغص أو ألم فوق منطقة الكبد

- بعد ٢ – ٤ أيام : الصفراء + غيبوبة كبدية

Most sensitive test in first 24 hour → prolonged INR

Management

حالة تسمم الباراسيتامول لازم تتحول للمستشفى بعد الرعاية الأولية و أول جرعة مضاد

1. General & Supportive measures (as before)

2. غسيل المعدة

3. Antidote

Acetylcysteine 600 mg sachets

- في خلال ٢٤ ساعة من تناول الدواء

- بيحتاج ١٧ جرعة .. انت هتبدأ أول جرعة و تحوله للمستشفى ياخذ الباقي

أول جرعة = ١٤٠ مجم/كجم (مثلاً : ٧٠ كجم = ١٦ كيس)

- الأكياس بتتحل في مية و تتشرب

- قيء الجرعة = أمبول بريمبران عضل + جرعة بديلة

- في حالة عدم جدوى مضادات القيء تعطي الجرعة بالأنبوب راييل بالتنقيط البطيء